

# Checkliste zu riskantem Alkoholkonsum in der Adoleszenz (AlkoAdol)

Risikofaktor ist im Vergleich zu Jugendlichen gleichen Alters bzw. anderen Familien:				
		Nicht erhöht	Leicht erhöht	Stark erhöht
<b>Anamnese zum Alkoholkonsum und Substanzmittelgebrauch</b>				
1	Menge und Häufigkeit des aktuellen Alkoholkonsums			
2	Früher Beginn des Konsums			
3	Begleitender Nikotinkonsum			
4	Begleitender Drogenkonsum			
5	Positive Erwartung einer angenehmen (entspannenden, euphorisierenden) Wirkung des Alkohols			
6	Wiederkehrende Gedanken an Alkohol (Craving)			
<b>Psychische Anamnese des Patienten</b>				
7	Irritables Temperament in der frühen Kindheit, geringe Fähigkeit, sich bei Spannung selbst zu beruhigen			
8	Probleme bei der Impulskontrolle und Selbststeuerung			
9	Neigung zu stimulierendem, riskantem Verhalten (sensation seeking)			
10	Alkoholkonsum wird als funktional erlebt für die eigene Popularität in der peer group			
11	Früher Beginn sexueller Aktivität			
12	Symptome internalisierender Störung			
13	Symptome externalisierender Störung			
14	Dissoziale Tendenzen			
15	Symptome einer Entwicklungsstörung bzw. Entwicklungsretardierung			
16	Lern- oder Leistungsprobleme in der Schule bzw. Ausbildung oder Schulprobleme			
<b>Familienanamnese (FA)</b>				
17	Inadäquater Erziehungsstil (z. B. Inkonsistenz, Vernachlässigung, unzureichende Beaufsichtigung, unangemessene Bestrafung)			
18	Konfliktvolle Beziehung zwischen Patient und Eltern			
19	Disharmonie zwischen Elternteilen			
20	FA (Eltern, Großeltern) Störung durch psychotrope Substanzen (F10-F19)			
21	FA (Eltern, Großeltern) Schizophrene, wahnhaftige Störung (F20-F29)			
22	FA (Eltern, Großeltern) Affektive Störung (F30-F39)			
23	FA (Eltern, Großeltern) Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung (F40-F49)			
24	FA (Eltern, Großeltern) Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Faktoren (F50-F59)			
25	FA (Eltern, Großeltern) Persönlichkeitsstörung (F60-F69)			